

献血にご協力 お願いします



新型コロナウイルス既感染者の献血受入れについて

令和5年12月22日より、新型コロナウイルス既感染者のうち、症状消失後（無症状の場合は陽性となった検査の検体採取日から）2週間が経過し、回復後に治療や通院を要する後遺症がなく問診等により全身状態が良好であることが確認できれば、献血にご協力いただけることとなりました。

現在、献血にご協力いただける方が大幅に減少し輸血用血液の在庫が不安定です。

多くの患者さんの命を救うため、皆様の積極的な協力をよろしくお願いいたします

令和7年5月28日(水)

時間：14:30～16:30

場所：日高博愛園

献血カードのアプリができました！献血日になればご自身のスマホで事前問診の回答が可能です。
また、献血ポイントなどがたまり、素敵な記念品と交換が可能になります。検査結果もスマホで確認が可能！



二次元バーコードを読み取って
アプリダウンロード！

 **App Store**
からダウンロード



 **Google Play**
で手に入れよう



※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 ※App Store は Apple Inc. のサービスマークです。 ※Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

※原則、400mLのみの受付となります。基準については裏面を御覧ください

けんけつ car



日本赤十字社 和歌山県赤十字血液センター 紀南出張所
Japanese Red Cross Society

和歌山県西牟婁郡上富田町生馬674番18
TEL 0739-33-9924 FAX 0739-33-9934

検索はこちらから

 和歌山県赤十字血液センター

検索

人間を救うのは、人間だ。Our world. Your move.

●安心して献血にご協力いただけるよう感染対策に取り組んでいます。

献血会場へお越しいただいた皆様には、マスク着用の推奨及び手洗い又は手指消毒をお願いしております。

その他にも

- (1) 受付及び問診にかかる周辺機器等の定期消毒
- (2) 献血協力者への献血バス乗車時の手指消毒
- (3) 献血バス内の換気(空調換気)
- (4) 採血スタッフの手袋の着用(献血者毎に交換)
- (5) 手指消毒の徹底及びマスクの着用(全職員)



●献血基準

献血される方の健康を守るために、献血できる基準があります。

献血の種類		全血献血		成分献血	
項目	200mL献血	400mL献血	血しょう成分献血	血小板成分献血	
1回献血量	200mL	400mL	600mL以下 (循環血液量の12%)		
年齢	16歳～69歳*1	男性17歳～69歳*1 女性18歳～69歳*1	18歳～69歳*1	男性18歳～69歳*1 女性18歳～54歳	
体重	男性45Kg以上・女性40Kg以上	男女とも50Kg以上	男性45Kg以上・女性40Kg以上		
最高血圧	90mmHg以上 180mmHg未満				
最低血圧	50mmHg以上 110mmHg未満				
脈拍	40回/分以上 100回/分以下				
体温	37.5℃未満				
年間献血回数 *2 (1年52週として換算)	男性6回以内 女性4回以内	男性3回以内 女性2回以内	血小板成分献血1回を2回分に換算して 血しょう成分献血と合計で24回以内		
年間総献血量 *2 (1年52週として換算)	200mL献血と400mL献血を合わせて 男性1,200mL以内・女性800mL以内				


*1 65歳から69歳までの方は、60歳から64歳までの間に献血の経験がある方に限られます。

*2 期間の計算は直近の採血を行った日から起算します。

このほか血色素量や血圧などの基準もあり、血液事前検査の結果によっては献血にご協力いただけないことがあります。

●以下の項目に該当する場合は、献血される方と患者さんの安全のために献血をご遠慮願っています。

- ① 3日以内に出血を伴う歯科治療(抜歯、歯石除去等)を受けた方
- ② 4週間以内に海外から帰国(入国)した方
- ③ 1ヵ月以内にピアスの穴をあけた方
- ④ エイズ検査が目的の方
- ⑤ 6ヵ月以内に下記に該当する方
 - (a) 不特定の異性または新たな異性との性的接触があった
 - (b) 男性どうしの性的接触があった
 - (c) 麻薬、覚せい剤を使用した
 - (d) 上記(a)～(c)に該当する人と性的接触をもった
- ⑥ 今までに下記に該当する方
 - (a) 輸血(自己血を除く)や臓器の移植を受けた
 - (b) ヒト由来プラセンタ注射薬を使用した
 - (c) 梅毒、C型肝炎、マラリア、シャーガス病にかかった



●安全性確保のため献血は帰国後4週間以降にお願いします。

●上記に該当されない方でも、献血される方や患者さんの安全を確保するため、健診医の判断によりご遠慮いただくことがありますので予めご了承ください。